

# SUKELTAJATODISTUS

## LÄÄKÄRINTARKASTUSOHJE

### Absoluuttiset kontraindikaatiot - vasta-aiheet sukeltajatodistukselle

- Sydämen vajaatoiminta
- Angina pectoris, sydänperäinen rintakipu
- Sydäninfarkti viimeisen 12 kuukauden aikana
- Oireinen läppäahtaus
- Oireinen sydämen rytmihäiriö
- Sydämen väliseinän reikä
- Rasituksen tai kylmän aiheuttama astma tai bronkiaalinen hyperreaktiviteetti, keuhkoputken yliärtyvyys
- Keuhkohtaumatauti
- Restriktiivinen keuhkosairaus, hengitysvajaus ja alentunut suorituskyky
- Aikaisempi spontaanipneumothorax, ilman vammaa tullut ilmarinta
- Keuhkojen laajentuma, keuhkoputkien laajentuma, keuhkopussin kiinnikkeet, keuhkojen bulla-rakkulat
- Aikaisemmat kouristukset (epilepsia yms.) pois lukien kuume-kouristukset
- Intrakraniellit tuumorit tai aneurysmat, kallonsisäiset kasvaimet tai pullistumat
- Aikaisemmat TIA-kohtaukset tai aivoverenvuodot
- Aikaisempi spinaalivaurio, selkäydinvaurio, sairaus tai leikkaus, josta on jäänyt jälkioireita
- Aikaisemmat tyypin II sukeltajataudit, joista on jäänyt pysyviä neurologisia jälkioireita
- Menieren tauti
- Tois- tai molemminpuolinen korvakäytäväatresia, korvakäytävän umpeuma
- Avoin tärykalvoperforaatio, reikä tärykalvossa
- Myringotomia, jossa putki, putkitettu korva
- Aikaisempi kuuloluuleikkaus (stapes/malleolus/incus)
- Aikaisempi sisäkorvaleikkaus
- Aikaisempi pyöreän tai soikean ikkunan repeämä
- Muu sisäkorvasairaus, ikähuonokuuloisuus
- Korjaamaton ylempien ilmäteiden ahtaus
- Laryngektomia tai osittaisen laryngektomian jälkitila, kurkunpäänpoisto tai osittaisen poiston jälkitila
- Trakeostomia, hengitysavanne
- Korjaamaton kurkunpään pullistuma laryngocele
- Aikaisempi sisäkorvaperäinen sukeltajatauti, josta jälkioireita
- Mahanportin ahtaus
- Ohutsuolen tukkeutumistaipumus
- Suolistofisteli, suolistoavanne
- Ruokatorven pullistuma
- Anamnestinen gastroesofageaalinen refluksi, refluksitauti
- Ruokatorven kurouma
- Vatsanpeitteiden tyrä